



Nieuwsbrief

Stinzentuin Mildenburg



Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap

maart 2022 - No 3



Vroege sterhyacint

Inschrijven: [Inschrijven voor de nieuwsbrief](#)

Nieuwsbrief van de "Werkgroep Stinzentuin Mildenburg"

Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap

O.l.v. René Vervoort en bestaat verder uit

Erik de Boer, Corrie Engelblik, Tienieke Bosker

Michael van der Kaay en Peter Moree

Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg

Redactie: Jan Engelblik

Website: www.stinzentuin-mildenburg.nl

Contact: webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl

Uitschrijven: [Uitschrijven van de nieuwsbrief](#)

Excursie naar de Stinzentuin Mildenburg door de KNNV "Ijssel en Lek "

Op 3 maart heeft de KNNV " Ijssel en Lek " de Stinzentuin Mildenburg bezocht. Betty Kooistra, uit Friesland, gaf op een professionele en interessante wijze uitleg over de aanwezige stinzenplanten aan de groep van de KNNV.




Vroege roze sterhyacint

Scilla bifolia rosea - Aspergefamilie

Bloeitijd: maart - april

De vroege sterhyacint (*Scilla bifolia*) is een plant uit de aspergefamilie (*Asparagaceae*) laat zich nog schuchter zien. In Nederland is ze een stinzenplant, die vooral in het Noorden van Nederland in het wild en op buitenplaatsen in loofbossen op vruchtbare grond voorkomt. De vroege sterhyacint lijkt veel op de Oosterse sterhyacint (*Scilla siberica*), maar bij deze laatste staan de bloemen niet omhoog, maar knikken ze. De plant komt van oorsprong voor in Midden- en Zuid-Europa en in Klein-Azië. In België is de plant inheems in de streek tussen Samber en Maas.



Vingerhelmbloem

*Corydalis solid*a - papaverfamilie

Bloeitijd: maart - april

Vingerhelmbloem is een bloeier in het vroege voorjaar. De plant heeft een tros met licht paarsrode tot witte bloemen. Deze zijn tweezijdig symmetrisch en hebben de vorm van een helm. Ze hebben ook een spoor met nectar. Onder elke bloem zit een schutblad dat vingervormig is ingesneden. De kleur van de bladeren en stengel is wasachtig blauwgroen. Ondergronds is een knol te vinden waaruit vroeg in het voorjaar de stengel tevoorschijn komt. De knol is sponsachtige gevuld.



Helleboris oriëntalis

Helleborus orientalis is een prachtige winterbloeier. Nieskruid houdt van humusrijke kalkgrond. Het is een "bossig" groeiende plant. Blad glanzend donkergroen. In winter lang aanblijvend. Bloemen februari - april. Rode, roze en witte tinten. Hoogte circa 40 cm. Voor humusrijke grond in de halfschaduw. Verdraagt zomerdroogte.





Galantus nivalis veridapice

Het bijzondere van deze soort is dat de buitenste bloemblaadjes groene punten hebben. Normaal gesproken hebben alleen de binnenste bloemblaadjes een groen merkje. Je komt overigens allerlei spellingsvarianten tegen voor de naam van dit sneeuwkllokje

Sneeuwkllokje

Galanthus Woronowi

(Glanzend sneeuwkllokje)

Bloeitijd: januari - maart

Is de determinatie nog steeds niet echt duidelijk, dan kan een dwarsdoorsnede van het blad uitkomst bieden.

Onder een microscoop of een vergrootglas is een duidelijk verschil te zien. Galanthus ikariae heeft grote luchtzakken tussen de cellen en de eigenlijke cellen liggen niet in een vast patroon. Bij Galanthus woronowii ontbreken die luchtzakjes.



Scilla mischstchenkoana / Streephyacint

Bloeitijd: februari maart

De plant komt van nature voor in de Kaukasus en Zuid-Rusland. In 1931 of 1936 introduceerde het Nederlandse bollenbedrijf Van Tubergen deze plant in tuinen in West-Europa. De plant wordt daarom vaak aangeduid, met een naam om op te oefenen, *Scilla mischtschenkoana* 'Tubergeniana', alsof het een cultivar zou zijn of zelfs als *Scilla tubergeniana*, alsof het een andere soort zou zijn. Bloemdekklippen niet vergroeid en heeft lange meeldraden. Kan verward worden met de buishyacint. (*Puschkinia scilloides*)





De krokus Sieberi

Bloeitijd: januari - maart

Krokus (Crocus) is een geslacht uit de lissenfamilie (Iridaceae), dat 90 soorten omvat. Hiervan is circa een derde deel herfstbloeier. De krokussen zijn vooral afkomstig uit de bergen rond de Middellandse Zee. Het grootste aantal soorten zijn afkomstig uit de Balkan en Klein-Azië.



De Crocus chrysanthus

Bloeitijd: januari - maart

Wordt gewoonlijk de 'sneeuwrokus' of "vroeg krokus" genoemd, omdat hij zo vroeg in het jaar bloeit. Hij is nauw verwant aan *Crocus biflorus*; sommige van de cultivars die als *Crocus chrysanthus* worden verkocht, zijn *Crocus biflorus*-hybriden.